

⚠ BATTERY WARNING KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.	
--	---

NOTE BS EN IEC 60086-4:2019, Figure 9, modified.

“If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children”; and

“If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.”

No obvious symptoms

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot;
- appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;
- be tired or lethargic;
- be quieter or more clindy than usual or otherwise “not themselves”;
- lose their appetite or have a reduced appetite; and
- not want to eat solid food / be unable to eat solid food.

These sort of symptoms vary or fluctuate with the pain increasing and then subsiding.

A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help.

The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with “flat” or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

Ⓒ BATTERIEWARNUNG

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

„Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern“ und „Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.“

Keine offensichtlichen Symptome.

Leider ist es nicht erkennbar, ob eine Knopfzellenbatterie in der Speiseröhre eines Kindes steckt. Es sind keine spezifischen Symptome damit verbunden. Das Kind könnte:

- husten, würgen oder sabbern;
- anscheinend Magenschmerzen oder einen Virus haben;
- krank sein;
- auf den Hals oder den Magen zeigen;
- Schmerzen im Unterbauch, in der Brust oder im Hals haben;
- müde oder lethargisch sein;
- ruhiger oder anhänglicher als gewöhnlich oder auch „nicht es selbst“ sein;
- keinen oder weniger Appetit haben und
- keine feste Nahrung zu sich nehmen wollen / nicht in der Lage sein können, feste Nahrung aufzunehmen.

Diese Symptome variieren oder nehmen mit zunehmendem Schmerz zu und lassen dann nach.

Ein spezifisches Symptom beim Verschlucken von Knopfzellenbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut. Wenn das Kind nicht sofort ärztliche Hilfe aufsucht.

Der Mangel an eindeutigen Symptomen ist der Grund, weshalb bei „flachen“ oder Ersatz-Knopfzellenbatterien zu Hause und bei Produkten, die diese enthalten können, äußerste Vorsicht geboten ist.“

Ⓒ AVERTISSEMENT RELATIF LA BATTERIE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous voire la mort. Des brûlures graves peuvent se produire dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

« Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants » ; et « Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin ».

Pas de symptômes évidents.

Malheureusement, il est difficile de savoir si une pile bouton est coincée dans l'œsophage (conduit alimentaire) d'un enfant. Il n'y a pas de symptômes spécifiques associés à cette situation. L'enfant peut :

- tousser, avoir des haut-le-cœur ou baver beaucoup ;
- sembler souffrir de maux d'estomac ou d'un virus ;
- être malade ;
- montrer du doigt sa gorge ou son estomac ;
- avoir mal à l'abdomen, à la poitrine ou à la gorge ;
- être fatigué ou lethargique ;
- être plus silencieux ou plus réservé que d'habitude ou ne pas être « lui-même » ;
- perdre l'appétit ou avoir un appétit réduit ; et
- ne pas vouloir manger d'aliments solides / être incapable de manger des aliments solides.

Ce type de symptômes varie ou fluctue, la douleur augmentant puis s'atténue.

Les vomissements de sang frais (rouge vif) sont un symptôme spécifique à l'ingestion de piles boutons. Si l'enfant a ce symptôme, consultez immédiatement un médecin.

L'absence de symptômes clairs explique pourquoi il est important d'être vigilant en ce qui concerne les piles bouton « plates » ou de rechange dans la maison et les produits qui les contiennent.“

Ⓒ AVVERTENZA BATTERIA.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

L'ingestione può indurre ustioni da sostanze chimiche, perforazione di tessuti molli e morte. Possono verificarsi gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione. Consultare un medico immediatamente.“

“Se il vano batteria (se presente) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini”; e “Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.“

Nessun sintomo evidente.

Sfortunatamente, non è evidente quando una batteria a bottone è bloccata nell'esofago di un bambino (canale alimentare). Non ci sono sintomi specifici associati a questo. Il bambino potrebbe:

- tossire, vomitare o salivare molto;
- sembrare di avere mal di stomaco o un virus;
- essere ammalato;
- indicare la gola o lo stomaco;
- avere dolore all'addome, al torace o alla gola;
- essere stanco o letargico;
- essere più tranquillo o più appiccicoso del solito o comunque “non se

stesso”;

- perdere l'appetito o avere un appetito ridotto; e
- non voler mangiare cibi solidi / non essere in grado di mangiare cibi solidi.

Questi tipi di sintomi variano o fluttuano con il dolore che aumenta e poi si attenua.

Un sintomo specifico dell'ingestione di una batteria a bottone è il vomito di sangue fresco (rosso vivo). Se il bambino fa questo, cercare aiuto medico immediato.

La mancanza di sintomi chiari è il motivo per cui è importante essere vigili con batterie a bottone “scariche” o di scorta in casa e nei prodotti che li contengono.“

Ⓒ ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingesta de las pilas puede provocar quemaduras químicas, perforación de los tejidos blandos y la muerte. Se pueden producir quemaduras graves durante las dos horas posteriores a la ingesta. Pida atención médica inmediatamente.

“Si el compartimento de las pilas (en caso de haberlo) no se cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños”; y “Si cree que pueden haberse ingerido pilas o estas pueden haberse colocado en cualquier parte dentro del cuerpo, pida atención médica inmediatamente.“

Sin síntomas obvios.

Por desgracia, no aparecen signos obvios cuando una pila de botón o moneda está alojada en el esófago (tubo digestivo) de un niño. No existen síntomas concretos asociados a esta situación. El niño podría presentar los siguientes comportamientos:

- toser, tener arcadas o babear de forma considerable;
- parecer tener una enfermedad de estómago o virus;
- parecer enfermo;
- señalarse la garganta o el estómago;
- sufrir dolor en el abdomen, el pecho o la garganta;
- estar cansado o atareado;
- estar más callado o calmado de lo habitual, o no ser él mismo por otros motivos;
- perder su apetito o tener menos ganas de comer; y
- no querer o no poder comer alimentos sólidos.

Este tipo de síntomas varían o fluctúan con el aumento del dolor y después se calman.

Un síntoma concreto de la ingesta de pilas de botón y de moneda es el vómito de sangre fresca, con un color rojo brillante. Si el niño vomita de esta manera, pida atención médica inmediatamente.

La ausencia de síntomas claros es el motivo por el que resulta importante tener controladas las pilas de botón o moneda de repuesto tanto en casa como en los productos que las contienen.

Ⓒ AVISO SOBRE PILHAS.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

A ingestão de pilhas pode resultar em queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Consulte um médico imediatamente.

“Se o compartimento das pilhas (se aplicável) não fechar corretamente, interrompa a utilização do produto e mantenha-o fora do alcance das crianças”; e “Se suspeitar que as pilhas foram ingeridas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, consulte um médico imediatamente.“

Sem sintomas óbvios.

Infelizmente, o alojamento de uma pilha-botão ou de uma pilha tipo moeda no esôfago (tubo digestivo) de uma criança não é óbvio. Não existem sintomas específicos associados a esta situação. A criança pode:

- tossir, ter vômitos ou babar-se muito;
- parecer ter dor de estômago ou um vírus;
- sentir-se doente;
- apontar para a garganta ou estômago;
- ter dor no abdômen, peito ou garganta;
- estar cansada ou letárgica;
- estar mais quieta ou quiexosa que o habitual ou “não parecer ela própria”;
- perder o apetite ou ter menos apetite; e
- não querer comer alimentos sólidos/não conseguir comer alimentos sólidos.

Este tipo de sintomas pode variar ou apresentar diferentes intensidades com o aumento da dor e, depois, diminuir.

Um sintoma específico resultante da ingestão de pilhas-botão ou pilhas tipo moeda é o vômito de sangue fresco (vermelho vivo). Neste caso, deve consultar um médico imediatamente.

Devido à ausência de sintomas claros, sempre que existirem pilhas vazias, pilhas sobressaltadas ou pilhas tipo moeda em casa, ou produtos que as contenham, é muito importante manter a vigilância.

Ⓒ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΗΡΙΑ.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Η κατάποση μπορεί να επιφέρει χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Βαρύτατα εγκαύματα μπορούν να προκύψουν εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

«Αν το διαμέρισμα μπαταρίας (αν έχει υπάρχει) δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά», και «Αν πιστεύετε ότι μπορεί μπαταρίες να έχουν καταποθεί ή εισαχθεί πεί

οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα.»

Δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα.

Δυστυχώς δεν είναι εμφανές πότε μια μπαταρία τύπου κουμπιού ή κέρματος έχει σφηνώσει στον οισοφάγο (σωλήνα κατάποσης τροφής) ενός παιδιού. Δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα που σχετίζονται με αυτό το συμβάν. Το παιδί θα μπορούσε:

- να βήχει, να έχει τάση για εμετό ή αυξημένη σιελόρροια,
- να εμφανίζεται τιτ έχει στομαχική διαταραχή ή ίωση,
- να είναι αδιάθετο,
- να δείχνει το λαιμό ή το στομάχι του,
- να έχει πονόκοιλο, πόνο στο στομάχι ή στο λαιμό,
- να είναι κουρασμένο ή ληθαργικό,
- να είναι πιο ήρεμο ή πιο προσκολλημένο πάνω σας από το συνηθισμένο ή γενικά «όχι ο εαυτός του»;
- να μην έχει όρεξη ή να έχει μειωμένη όρεξη και
- να μη θέλει / να μην μπορεί να φάει στερεά τροφή.

Αυτοί οι τύποι συμπτωμάτων ποικίλλουν ή κυμαίνονται και ο πόνος αυξάνεται και κατόπιν υποχωρεί.

Ένα σύμπτωμα ειδικά της κατάποσης μπαταρίας τύπου κουμπιού ή κέρματος είναι εμετός με φρέσκο αίμα (με ζωρό κόκκινο χρώμα). Αν το παιδί παρουσιάσει αυτό το σύμπτωμα ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Η απουσία σαφών συμπτωμάτων είναι ο λόγος που είναι σημαντικό να έχετε υπό στενή επίτηρηση τόσο τις εξαντλημένες όσο και τις εφεδρικές μπαταρίες τύπου κουμπιού ή κέρματος γενικά στο σπίτι αλλά και τις μπαταρίες στα προϊόντα που τις περιέχουν.»

Ⓖ BATTERIJWAARSCHUWING.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Inslikken kan chemische verbranding, perforatie van zacht weefsel en de dood tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na inslikken kan sprake zijn van ernstige brandwonden. Roep onmiddellijk geneeskundige hulp in.

“Als het batterijcompartiment (mits van toepassing) niet goed gesloten kan worden, gebruik het product dan niet meer en houd het buiten het bereik van kinderen”; en “Als u denkt dat er batterijen ingeslikt zijn of in het lichaam geplaatst zijn, roep dan onmiddellijk geneeskundige hulp in.”

Geen zichtbare symptomen.

Het is helaas niet zichtbaar wanneer er een knoopcel in de oesophagus (slok-darm) is blijven zitten. Dit verschijnsel levert geen specifieke symptomen op. Het kind kan:

- erg hoesten, kokhalzen of kwijlen;
- buikpijn hebben of een virus hebben;
- naar de keel of de buik wijzen;
- pijn in de onderbuik, de borst of de keel hebben;
- moe of lethargisch zijn;
- rustiger of emotioneler zijn dan gewoonlijk of op een andere manier ""niet zichzelf zijn"";
- geen of een verminderde eetlust hebben; en
- geen vast voedsel willen of kunnen eten.

Dit soort symptomen variëren of veranderen naarmate de pijn erger wordt en verminderen vervolgens in intensiteit.

Een specifiek symptoom van inslikken van een knoopcel is opgeven van vers (helderrood) bloed. Als het kind dit doet, roep dan onmiddellijk geneeskundige hulp in.

De afwezigheid van duidelijke symptomen betekent dat het grootste belang is waakzaam te zijn bij het gebruik van ""platte"" of reservebatterijen of knoopcellen in huis en bij het gebruik van producten die zulke batterijen bevatten.

Ⓖ BATTERIVARNING.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHLL FÖR BARN.

Sväljning kan ge upphov till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå 2 timmar efter sväljandet. Sök omedelbart läkarhjälp.

“Om batterifacket (om tillämpligt) inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn”; och “Om du misstänker att batterier kan ha sväls eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarhjälp.”

Inga uppenbara symptom.

Tyvärr är det inte alltid uppenbart när en knapp eller knappcells-batteri fastnar i ett barns ösophagus (matstrupe). Det finns särskilda symptom som förknippas med detta. Barnet kanske:

- hostar, får kväljningar eller dreglar mer än vanligt;
- beter sig som om det är dåligt i magen eller har fått ett virus;
- kräks;
- pekar på sin hals eller mage;
- har ont i magen, bröstet eller halsen;
- blir trött eller letargisk;
- är förtvålade eller mer apatisk än vanligt eller på annat sätt “inte är sig själv”;
- förlorar aptiten eller har en förminskad aptit; och
- inte vill äta fast föda / inte kan äta fast föda.

Dessa typer av symptom varierar eller fluktuerar i och med att smärtan ökar och sedan minskar.

Ett specifikt symptom på sväljning av ett knappcells-batteri är kräkningar av färskt (klarrött) blod. Om barnet gör det, sök omedelbart läkarhjälp.

Frånvaron av tydliga symptom är anledningen till att det är viktigt att i hemmet vara vaksam med “platta” eller knappcells- och myntbatterier och produkter som innehåller dem.”

Ⓖ PARISTOJA KOSKEVA VAROITUS.

PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILLA.

Nieleminen voi aiheuttaa kemiallisiä palovammoja, pehmytkudoksen reikiintymistä ja kuoleman. 2 tunnin kuluessa nielemisestä voi ilmetä vakavia palovammoja. Hakeudu välittömästi lääkäriin hoitoon.

“Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta” ja “Jos uskot, että paristot on ehkä nieltä tai että ne ovat joutuneet jonkin kehonosan sisälle, hakeudu välittömästi lääkäriin.” Ei ilmeisiä oireita.

Valitettavasti ei ole helppoa nähdä päältä päin, kun nappiparisto on juuttunut lapsen ruokatorveen. Tähän ei liity erityisiä oireita. Lapsi voi:

- yskiä, kakoa tai kuolata paljon;
- näyttää kärsivän vatsavaivasta tai virussesta;
- olla sairas;
- osoittaa somella kurkkuaan tai vatsaansa;
- kärsiä kivusta vatsassa, rinnassa tai kurkussa;
- olla väsynyt tai unelias;
- ole hiljaisempi tai tarkettuvampi kuin tavallisesti tai ei muuten ole “oma itsensä”;
- menettää ruokahalunsa tai olla tavallista haluttomampi syömään; ja
- ehkä haluta kiellettyä kiinteästä ruoasta / olla kykenemätön syömään kiinteää ruokaa.

Tällaiset oireet vaihtelevat tuskan kasvaessa ja sen jälkeen hellittäessä.

Eriytyinen nappipariston nielemiseen viittaava oire on tuoreen (kirkaanpunainen) veren oksentaminen. Jos lapsi tekee näin, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Selkeiden oireiden puuttuminen on synnä siihen, että on tärkeää olla valppaana kotona olevien paristojen ja niitä sisältävien tuotteiden kanssa.”

Ⓖ ADVARSEL ANG. BATTERIER

OPPBÆVARES UTILGÆNGELIG FOR BARN.

Svelging kan føre til kjemiske brannskader (etseskader), perforering av blottvev, samt død. Allvorlige brannskader kan oppstå innen to timer etter inntak. Søk hjelp hos lege omgående.

„Dersom batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, så slutt å bruke produktet og oppbevar det utilgjengelig for barn”; og „Dersom du tror batterier kan ha blitt svelget eller har havnet inne i noen del av kroppen, så søk øyeblikkelig legehjelp.”

Ingen åpenbare symptomer.

Dessverre er det ikke åpenbart når et knappformet batteri eller et myntbatteri sitter fast i et barns spiserør.

Det er ingen spesifikke symptomer forbundet med dette. Barnet vil kunne:

- Hoste, brenke seg eller sikle mye
- Se ut til å ha magesyke eller virus
- Være syk
- Peke på halsen eller magen sin
- Ha smerter i magen, brystet eller halsen
- Være tross eller sløv
- Være mer stille eller mer lengete enn vanlig eller på annen måte “ikke seg selv”
- Miste appetitten eller har redusert appetitt; og
- Vise at det ikke vil spise fast føde/ikke kan spise fast føde

Denne typen symptomer varierer eller svinger med smerten som øker og de-retter avtar.

Et spesifikt symptom på inntak av knappformede batterier og myntbatterier er oppkast som inneholder friskt (lyserødt) blod. Hvis barnet gjør dette, så søk legehjelp omgående.

Mangelen på tydelige symptomer er årsaken til at det er viktig å være årvåken med hensyn til “flate” eller reserveknapp- eller myntbatterier i hjemmet og produktene som inneholder slike batterier.

Ⓖ BATTERI-ADVARSEL

OPPBÆVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og dødsfald. Der kan opstå alvorlige forbrændinger i løbet af 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.”

“Hvis batterikammeret (hvis relevant) ikke lukkes sikkert, skal du standse med at bruge produktet og holde det udenfor børns rækkevidde”; og “Hvis du har mistanke om, at et batteri muligvis er blevet slugt eller placeret et sted i kroppen, skal du straks søge lægehjælp”.

Ingen åbenlyse symptomer.

Dessværre er det ikke umiddelbart synligt, hvis en knapp eller et myntbatteri sidder fast i et barns spiserør. Der er ingen specifikke symptomer forbundet med dette. Barnet kan:

- hoste, få kvalme eller svelle meget;
- synes at have maveproblemer eller en virus;
- føle sig syg;
- pege på hals eller mave;
- få ondt i mave, bryst eller strube;
- blive træt eller sløv;
- være mere stille eller mere urolig end normalt eller på anden måde “ikke sig selv”;
- miste appetitten eller have nedsat appetit, og

– have mindre lyst eller ikke være i stand til at spise fast føde.

Disse symptomer varierer eller svinger med tiltagende og derefter aftagende smerter.

Et specifikt symptom på indtagelse af knap- og montbatterier er opkastning af frisk (meget rød) blod. Hvis barnet har sådanne problemer, skal du straks søge lægehjælp.

På grund af manglen på klare symptomer er det vigtigt at være på vagt overfor "flade" eller ekstra knap- eller montbatterier i hjemmet, herunder de produkter, der indeholder dem.

Ⓢ VAROVÁNÍ PRO BATERII.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Spolknutí může zapříčinit chemické popáleniny, perforaci měkké tkáně a smrt. K závažným popáleninám může dojít do 2 hodin po spolknutí. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

„Není-li příhrádka na baterii (pokud je použita) bezpečně zavěšená, přestaňte používat výrobek a uložte ho mimo dosah dětí“; a „Pokud si myslíte, že někdo spolkl baterii nebo si ji vložil do kteréhokoli tělního otvoru, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.“

Žádné zjevné příznaky.

Když se knoflíková nebo mincová baterie vzpříčí v jícnu (trávicí trubici) dítěte, není to bohužel vidět. Nejsou s tím spojeny žádné specifické symptomy. Dítě může:

- kašlat, dusit se nebo silně slinit;
- vypadat, že má žaludeční potíže nebo vředu;
- být pobledlý;
- ukazovat si na krk nebo na žaludek;
- mít bolesti v břiše, na hrudi nebo v krku;
- být unavené nebo letargické;
- být klidnější nebo přitulenější než obvykle, nebo se může „necítit ve své kůži“;
- ztratit chuť k jídlu nebo mít menší chuť k jídlu; a
- necítit nebo nemoci jist tuhou stravu.

Tento druh symptomů se liší nebo kolísá se silicí a pak polevující bolesti.

Specifickým symptomem pro spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie je vrácení čerstvé (jasné červené) krve. Pokud to u dítěte nastane, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Absence zřetelných symptomů je důvodem, proč je důležité dávat dobrý pozor na vybité nebo náhradní knoflíkové a mincové baterie v domácnosti a na výrobky, které je obsahují.

Ⓢ ELEM FIGYELMEZTETÉS.

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ.

Lenyelt esetén kéniaei égési sérülést, a lágy szövetek perforációját vagy halált okozhat. A lenyeltet követően 2 óra(n belül súlyos égési sérülés jelentkezhet. Haládektalanul forduljon orvoshoz.

„Ha az elem tartató (adott esetben) nem zárodék biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől“; „Ha úgy gondolja, a gyermek az elemet lenyelt vagy bármely testrészebe helyezett, haládektalanul forduljon orvoshoz.“

Žádné zjevné príznaky.

Když se knoflíková nebo mincová baterie vzpříčí v jícnu (trávicí trubici) dítěte, není to bohužel vidět. Nejsou s tím spojeny žádné specifické symptomy. Dítě může:

- kašlat, dusit se nebo silně slinit;
- vypadat, že má žaludeční potíže nebo vředu;
- být pobledlý;
- ukazovat si na krk nebo na žaludek;
- mít bolesti v břiše, na hrudi nebo v krku;
- být unavené nebo letargické;
- být klidnější nebo přitulenější než obvykle, nebo se může „necítit ve své kůži“;
- ztratit chuť k jídlu nebo mít menší chuť k jídlu; a
- necítit nebo nemoci jist tuhou stravu.

Tento druh symptomů se liší nebo kolísá se silicí a pak polevující bolesti.

Specifickým symptomem pro spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie je zvrácení čerstvé (jasné červené) krve. Pokud to u dítěte nastane, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Absence zřetelných symptomů je důvodem, proč je důležité dávat dobrý pozor na vybité nebo náhradní knoflíkové a mincové baterie v domácnosti a na výrobky, které je obsahují.

Ⓢ UTVAGA, BATERIA.

CHRONÍC PRZED DZIEĆMI.

Poknięcie może skutkować oparzeniami chemicznymi, perforacją miękkiej tkanki i śmiercią. W ciągu 2 godzin od spożycia mogą wystąpić poważne oparzenia. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.

„Jeśli komora na baterie (o ile jest zastosowana) nie zamyka się poprawnie, należy zaprzestąć użytkowania produktu i chronić go przed dziećmi“; oraz „Jeśli uważasz, że baterie zostały połknięte lub umieszczone wewnątrz ciała, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.“

Brak widocznych objawów.

Niestety, utknięcia baterii guzikowej lub pastylkowej w przełyku (przewodzie pokarmowym) dziecka nie daje widocznych objawów. Nie są z tym związane żadne określone objawy. Dziecko może:

- kaszleć, dławić się lub mocno ślinić;
- wykazywać objawy podobne do nieżyty żołądka czy zakażenia wirusem;

- mieć nudności;
- pokazywać na gardło czy żołądek;
- mieć bóle brzucha, kłatkę piersiową lub gardła;
- być zmęczone lub ospale;
- być cichsze niż zazwyczaj, „nie być sobą“;
- stracić lub mieć zmniejszony apetyt; oraz
- nie chcieć / nie móc jeść pokarmów stałych.

Tego rodzaju objawy ulegają zmianom w miarę nasilania i ustępowania bólu.

Pewnym objawem poknięcia baterii guzikowej lub pastylkowej jest wymiotowanie świeżą (jasnoczerwoną) krwią. Jeśli dziecko ma takie objawy, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Brak wyraźnych objawów oznacza, że należy być bardzo czujnym, mając w domu zapasowe baterie „plaskie“, guzikowe lub pastylkowe, a także przedmioty, które je zawierają.“

Ⓢ VÝSTRAHA K BATERII.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DĚTÍ.

Pri prehltnutí môže dôjsť k popáleninám, prepichnutiu mäkkého tkaniva a smrť. Ťážne popáleniny sa objavia do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

„Ak sa priechod na batériu (ak je prítomný) úplne nezatvorí, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí“ a „Ak si myslíte že dieťa mohlo batérie prehltnúť alebo ich vložiť do niektorej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.“

Žiadne viditeľné symptómy.

Gombikový alebo mincový batériu zaseknutý v pažeráku dieťaťa nie je, bohužiaľ, vidno. Nie sú s tým spojené žiadne konkrétne symptómy. Dieťa:

- môže veľmi kašľať, môže ho napínať alebo môže sliniť;
- môže sa zdať, že má podráždený žalúdok alebo vírus;
- môže mu byť nevoľno;
- môže ukazovať na hrdlo alebo žalúdok;
- môže mať bolesti žalúdka, hrude alebo hrda;
- môže byť unavené alebo letargické;
- môže byť tichejší alebo viac naviazaný ako zvyčajne „nie samo sebou“;
- môže strátiť chuť do jedla alebo mať menšiu chuť do jedla a
- nechce jesť pevnú potravu/nedokáže zjesť pevnú potravu.

Tento druh symptomů sa môže meniť alebo kolísat so zvyšujúcou sa a ustupujúcou bolesťou.

Konkrétnym symptomom pre požitie gombikovej alebo mincové batérie je zvracanie čerstvej (jasnocervej) krvi. Ak sa pre dieťa nevyhľadá okamžitá lekárska pomoc.

Nedostatek jasných symptomů je důvodem, proč je důležité dívat pozor na „ploché“ nebo náhradné gombikové a mincové batérie doma a vo výrobkoch, ktoré ich obsahujú.

Ⓢ OPOZORILO ZA BATERIJE.

HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK.

Zaužitje lahko povzroči kemične opekline, perforacijo mehkega tkiva in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

„Če se predal za baterije (če obstajajo) varno ne zapre, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite izven dosega otrok“; in „Če menite, da je nekdo morda pogoltnil baterije ali jih vstavil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.“

Brez očitnih simptomov.

Žal ni očitno, če je gumbna ali ploščata baterija obitčala v otrokovem požiralniku. S tem ni povezanih določenih simptomov. Otroci (lahko):

- kašlja, se davi ali se močno slini;
- zdi se, da ima želodčne težave ali vizio;
- bruha;
- kaže na grlo ali trebu;
- ima bolečine v trebuhu, prsih ali grlu;
- je utrujen ali letargičen;
- je tišji ali bolj moren kot običajno ali se kako drugače „neobičajno obnaša“;
- nima ali ima zmanjšan apetit; in
- ne želi jesti trdne hrane/ni more jesti trdne hrane.

Tovrstni simptomi se spreminjajo ali nihajo z bolečino, ki se poveča in nato umiri.

Specifičen simptom zaužitja gumbne in ploščate baterije je bruhanje sveže (svetlo rdeče) krvi. Če se to pojavi pri otroku, takoj poiščite zdravniško pomoč. Pomanjkanje jasnih simptomov je razlog, zakaj je pomembno, da ste doma pozorni na „prazne“ ali rezervne gumbaste ali ploščate baterije in na izdelke, ki jih vsebujejo.

Ⓢ PIL UYARISI.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN.

Yutma kimyasal yanmalara, yumuşak dokulara delinmesine ve ölüme neden olabilir. Yuttuktan sonraki 2 saat içinde ciddi yanmalar meydana gelebilir. Derhal tbbi müdahale isteyin.

“Pili bölmesi (varsı) sıkı kapanyorsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun” ve “pilleri yutulduğunda veya vücudun herhangi bir kısmına sokulduğunda şüpheleniyorsanız derhal tbbi müdahale isteyin.”

Açık semptom yoktur.

Ne yazık ki, bir diğme veya jeton pilin bir çocuğun yemek borusuna kaçtığına belirlisi görülemez. Bununla ilişkili özel bir belirtisi yoktur. Çocuk:

- öksürebilir, öksürebilir veya ağzının suyu çok akabilir;
- midesi bozulmuş veya midesinde virüs varmış gibi görünebilir;
- hasta olabilir
- boğazını veya karnını gösterebilir;
- karnında, göğsünde veya boğazında acı duyabilir;
- yorgun veya aşırı halsiz olabilir;
- normalden daha sessiz olabilir veya "her zamanki halinde" olmayabilir;
- iştahını kaybetmiş veya iştahı azalmış olabilir ve
- kati yiyecek yemek istemiyor / yiyemiyor olabilir.

Bu tür belirtiler değişebilir veya ağrıyla birlikte azalabilir veya yatışabilir. Düşme veya jeton tipi yutmanın belirli bir semptomu, taze kan (parlak kırmızı) kusemaktır. Çocuk kan kusarsa derhale tıbbi yardım isteyin.

Açık belirtilerin eksikliği nedeniyle, "düz" veya yedek düşme veya jeton pillerin ve bunları içeren ürünlerin evde kullanılırken tedbirli davranılması son derece önemlidir.

Ⓢ UPOZORENJE ZA BATERIJU. DRŽITE IZVAN DOHVATA DJECE.

Gutanje može uzrokovati kemijske opekline, perforaciju mekog tkiva i smrt. Do teških opekline može doći unutar 2 sata od gutanja. Odmah potražite liječničku pomoć.

Nema očiglednih simptoma.

Nazalost, nije uvijek jasno je li gumbasta baterija zaglavljena u djetetovu ezofagusu (jednjaku). Nema specifičnih povezanih simptoma. Dijete može:

- kašljati, imati nagon povraćanja ili jako sliniti;
- izgledati kao da ima želučane probleme ili virozu;
- biti bolestan;
- upirati u grlo ili želučad;
- imati bolove u trbuhu, prsima ili grlu;
- biti umorno ili letargično;
- biti tiše ili privrženije nego inače, odnosno „ne biti svoje“;
- izgubiti ili imati smanjen apetit; i
- odbijati čvrstu hranu / ne moći jesti čvrstu hranu.

Ovi simptomi variraju ili se mijenjaju s obzirom na povećanje odnosno smanjenje boli.

Simptom specifičan za gutanje gumbaste baterije je povraćanje svježe (jarko crvene) krvi. Ako dijete to čini, odmah potražite liječničku pomoć.

Izostanak jasnih simptoma razlog je zbog kojeg treba biti oprezan s „ravnim“ ili rezervnim gumbastim baterijama u kući i proizvodima koji ih sadrže.“

Ⓢ „AVERTIZARE CU PRIVIRE LA BATERIE.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPILOR.

Înghițirea poate duce la arsuri chimice, la perforare țesuturilor moi și la deces. Arsurile grave pot apărea în 2 ore de la ingerare. Solicitați imediat asistență medicală.

„În cazul în care compartimentul pentru baterii (dacă este cazul) nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor;” și „Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.”

Nu există simptome evidente.

Din nefericire, nu este evident când un o baterie de tip nasture sau monedă este blocată în esofag (conducta alimentară) unui copil. Nu există simptome specifice asociate cu acest lucru. Copilul ar putea:

- să tușească, să caște sau să saliveze mult;
- să pară că are probleme cu stomacul sau un virus;
- să fie bolnav;
- să arate spre gât sau spre stomac;
- să aibă o durere în abdomen, piept sau gât;
- să fie obosit sau letargic;
- să fie mai tăcut sau mai atașat decât de obicei sau să nu fie „el însuși“;
- să își piardă pofta de mâncare sau să aibă un apetit redus; și
- să nu dorească să mănânce alimente solide / nu poată mânca alimente solide.

Acest tip de simptome variază sau fluctuează, durerea crescând și apoi dispărând.

Un simptom specific pentru ingestia de baterii tip nasture și monedă sunt vărsăturile cu sânge proaspăt (roșu aprins). În cazul în care copilul face acest lucru, solicitați imediat ajutor medical.

Lipsa simptomelor clare este motivul pentru care este important să fiți vigilenți cu bateriile „plate” sau cu bateriile de rezervă din casa de tip nasture sau monedă și cu produsele care le conțin.

Ⓢ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯТА.

ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.

Поглъщането може да доведе до химически изгаряния, перфорация на меки тъкани и смърт. Тежки изгаряния могат да възникнат до 2 часа след поглъщане. Незабавно потърсете медицинска помощ.“

„Ако отделението за батерия (ако има таква) не се затваря безопасно, спрете използването на продукта и го дръжте далеч от деца;” и „Ако смятате, че е възможно батерия да са поглътати или поставени във вътрешността на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ“.

Няма видими симптоми.

За съжаление, когато малка батерия е заседнала в езофаг (кранопровода) на дете, няма видими признаци. Няма специфични симптоми, свързани с това. Детето може:

- да кашля, да се задавя или да отделя обилно количество слюнка;

- да изглежда сякаш има стомашно разстройство или вирус;
- да е болно;
- да сочи гърлото или стомаха си;
- да има болки в коремната област, гърдите или гърлото;
- да чувства умора или сънливост;
- да е по-тихо или по-прилепчиво от обичайното или по друг начин да има необичайно поведение;
- да страда от загуба на апетит или намалял апетит; и
- да не иска да се храни с твърди храни/да не може да яде твърди храни.

Този тип симптоми варират или са налични в различна степен с увеличаване на болката и след това затихване. Специфичен синдром за поглъщане на батерия е повръщането на прясна (ярко червена) кръв. Ако се случва това с детето, незабавно потърсете медицинска помощ.

Липсата на ясни симптоми е причината да сте бдителни с изтощените или резервни малки кръгли батерии у дома и с продуктите, които волят в контакт с тях.“

Ⓢ PATAREI HIAIUTS.

HOIDKE LASTELE KÄTTESAAMATULT.

Alla neelamine võib põhjustada keemilisi põletusi, pehmete kudede perforatsiooni ja surma. Rasked põletused võivad leida aset 2 tunni jooksul pärast neelamist. Põõrduge kohe abi saamiseks arsti poole.

„Kui patareisektsioon (olemasolu) ei sulge korralikult, lõpetage toote kasutamine ja hoidke toote lastele kättesaamatult;” ja „Kui arvate, et patareid on alla neelatud või asetatud mis tahes kehaosa sisse, pöörduge abi saamiseks kohe arsti poole.“

Ilmsed sümptomid puuduvad.

Kahjuks puuduvad selged tunnused, kui väike nõõppatari on lapse söögitorusse kinni jäänud. Sellega pole seotud mingid konkreetsed sümptomid. Laps võib:

- kõhida, läkastada või süüleeturist võib oluliselt suurendada;
- tunduda kannatavat kõhuhäda või viiruse käes;
- tunduda olevat haige;
- osutada oma kõri või kõhu suunas;
- tunda valu oma kõhus, rinnus või kõris;
- olla väsinud või letargiline;
- olla tavapärasest vaiksem kui lähedale hoidvam või mingil muul moel „teismoodi kui tavalliselt“;
- kaotada söögisuvi või olla väiksema isuga; ja
- mitte tahta süüa tahket toitu / mitte süüa süüa tahket toitu.

Sellist laadi sümptomid võivad vahelduda või kõikuda koos valu suurenemise ja seajäre vähenemisega.

Väikese nõõppatari allaneelamisega kaasnev spetsiifiline sümptom on värskete vere (erupunane) oksendamine. Kui lapsel nii on, pöörduge abi saamiseks kohe arsti poole.

Just selgete sümptomite puudumise tõttu tuleb majapidamises nõõppatariide või neid sisaldavate toodete olemasolu väga tähelepanelik olla.

Ⓢ ISPEJIMAS DEL BATERIJU.

LAIKYTI VAIKAMS NEPAISIEKIMOJE VIETOJE.

Prarijus galima patirti cheminį nudegimą, pradurti minkštuosius audinius ir sukelti mirtį. Stiprūs nudegimai gali atsirasti per 2 valandas nuo prarijimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

„Jei baterijų skyrius (jei yra) tinkamai neuždaro, nebenaudokite įrenginio ir laikykite jį atokiau nuo vaikų;” ir „Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba patektų į kūno dalis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją“.

Nėra akivaizdžių požymių.

Deja, nėra aiškių požymių, kada vaiko stemplėje įstringa baterija (tablete). Specifinių su tuo susijusių požymių nėra. Vaikas gali:

- daug kosėti, springti, jam gali gausiai tekėti seilės;
- turėti skrandžio sutrikimų arba virusą;
- susirgti;
- rodyti į gerklę arba skrandį;
- jausti pilvo, krūtines ar gerklės skausmą;
- būti pavargęs arba vangus;
- būti tylus ar labiau užsisiklęs nei įprastai arba prastai jaustis;
- prarasti arba turėti sumažėjusį apetitą;
- nenorėti ir (arba) negalėti valgyti kieto maisto.

Skausmui stiprinant ar silpnėjant, šie požymiai gali keistis.

Specifinis požymis prarijus bateriją (tablete) – vėmimas šviežiu (ryškiai raudono spalvos) krauju. Jei vaikas taip elgiasi, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Jei nėra aiškių simptomų, svarbu būti budriems dėl namuose esančių baterijų (tablečių) ir įrenginių, į kuriuos jos įdėtos.

Ⓢ BATERIJAS BRĪDINAJUMS.

GLABĀ BĒRNIEM NEPIEJAMĀ VIETĀ.

Norīšana var radīt ķīmiskus apdegumus, mīksto audi perforāciju un nāvi. Smagi apdegumi var rasties 2 stundas pēc norīšanas. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

„Ja baterijas nodalījums (ja piemērojams) nav cieši aizvērts, pārtrauciet precies lietošanu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā;” un „Ja domājat, ka baterija varētu būt norīta vai ievietota jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.“

Nav acinredzamu simptomu.

- daudz klepus, rīstīšanās vai siekalološamās;
- var būt šķietami kuņģa darbības traucējumi vai vīrus;
- slihta dūša;
- norāda uz rīkli vai vēderu;
- sāpes vēderā, krūtīs vai kaklā;
- nogurums vai miegainība;
- kļuski vai uzbāzīgāki nekā parasti, vai citādi „ne savs”;
- zaudēt apetīti vai būt samazinātā apetīte;
- nevēlās ēst cieta pārtiku / nespēj ēst cieta pārtiku,

Šāda veida simptomi var mainīties vai svārstīties, sāpēm palielinoties un pēc tam izzūd.

Skaidru simptomu trūkums ir iemesls, kāpēc ir svarīgi būt uzmanīgiem, ja ir „izlādējušās” vai rezerves pogas vai monētas baterijas, mājās un ar precēm, kas tās satur.”

SRB UPOZORENJE O BATERIJAMA

DRŽITE VAN DOMAŠA, I A DECE.

Gutanje može dovesti do hemijskih opekotina, perforacije mekog tkiva i smrtnog ishoda. U roku od 2 sata nakon gutanja može doći do teških opekotina. Odmah potražite medicinsku pomoć.

„Ako se odeljak za bateriju (tamo gde je to primenljivo) ne zatvara na bezbedan način, prestanite da koristite proizvod i držite ga dalje od dece“; ako „smatrate da postoji mogućnost da su baterije progutane ili da su dospele u telo na neki drugi način, odmah potražite medicinsku pomoć.“

„Bez očiglednih simptoma,

Nažalost, ne mora biti očigledno da se dugmasta baterija zaglavila u ezofagu-
s (jednjaku) deteta. Ne postoje specifični simptomi koji se mogu povezati sa
ovim slučajem. Moćuje je da se dete ispoljava sledeće:

- kašlje, često se zagrcne ili luči povećanu količinu pljuvačke;
- izgleda kao da ima stomachne probleme ili stomachni virus;
- oseća mučninu;
- pokazuje na vrat ili stomak;
- ima bolove u predelu abdomena, grudi ili vrata;
- umorno je ili bezvoljan;
- tiše je ili mirnije nego obično, odnosno ispoljava neke druge „neobičajene karakteristike“;
- pokazuje znakove gubitka ili smanjenja apetita; i
- ne želi / ne može da jede čvrstu hranu.

Ove vrste simptoma mogu se razlikovati ili menjati u zavisnosti od jačanja ili slabljenja bola.

Karakterističan simptom kod gutanja dugmaste baterije jeste povraćanje sveže krvi (svetlocrvene boje). Ako dete pokazuje ove znakove, odmah potražite medicinsku pomoć.

Zbog nedostatka jasnih simptoma veoma je važno voditi računa o „ravnim“ i rezervnim dugmastim baterijama u domaćinstvu, kao i o proizvodima koji ih sadrže.“

Ⓢ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО АКУМУЛЯТОР

ТРИМАТИ В МІСЦЯХ НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ

Ковтання може призвести до хімічних опіків, прориву м'яких тканин і навіть смерті. Впродовж 2 годин після проковтування можуть виникнути важкі опіки. негайно зверніться за медичною допомогою.

“Якщо відсік акумулятора (за наявності) неможливо надійно закрити, припиніть використання виробу і зберігайте його в місцях, недоступних для дітей”. “Якщо ви вважаєте, що могло відбутися проковтування акумуляторів або їх потрапляння всередину тіла, негайно зверніться за медичною допомогою.”

Відсутність явних симптомів.

На жаль, важко визначити, чи застрів дисковий або таблетковий акумулятор у стравоході дитини. Для цього відсутні специфічні симптоми. Дитина може:

- багато кашлати, давитися або пускати слини;
- виглядати так, наче у неї розлад шлунка або вірусу;
- погано почуватися;
- показувати на горло або живіт;
- відчувати біль у животі, грудях або горні;
- мати втомлений або сонний вигляд;
- бути тихішою чи примхливішою, ніж зазвичай, бути «не в собі»;
- втратити апетит або мати гірший, ніж зазвичай, апетит;
- відмовлятися від твердої їжі / бути неспроможною зжигати тверду їжу.

Такі симптоми можуть змінюватися чи посилюватися/послаблюватися разом із болем.

Специфічним симптомом для проковтування дискових або таблеткових акумуляторів є блювання свіжою (яскраво-червоною) кров'ю. Якщо дитина не звертається за негайною медичною допомогою.

Саме відсутність чітких симптомів є причиною того, чому так важливо дуже обережно поводитися вдома з запасними дисковими або таблетковими акумуляторами та виробами, що їх містять.

© БАТАРЕЯ ЕСКЕРТУ

БАЛАПАРЛЫН КОЛЫ ЖЕТПЕЙТІН ЖЕРЛЕ ҰСТАНЫЗ

Бұйымды жұту химиялық күйікке, жұмсақ тіндердің тесілуіне және өлімге әкелуі мүмкін. Ауыр күйіктер жұтылғаннан кейін, 2 сағат ішінде пайда болуы мүмкін. Дәреу медициналық көмекке жүгініңіз.

«Егер батарея бөлімі (бар болса) мықтап жабылмаса, өнімді пайдалануды тоқтатып, оны балалардан аулақ ұстаңыз»; және «Егер сіз батареялар жұтылған немесе дененің кез келген бөлігіне енгізілген болуы мүмкін деп ойласаңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз»

Айкын белгілердің болмауы.

Өкінішке орай, шынашақ немесе тиын тәрізді батарея баланың өңешінде (тамақ түтігінде) тұрып қалғаны белгісіз. Осыған байланысты нақты белгілер жоқ. Балаға келесі белгілер бақылау мүлкін:

- Белгилер жок, балдаа келсе белгилер болуш мүмкүн.
- жөп жөтөлү, күсү немесе сөлекпейн шашыруту;
 - асказанын бузылуш немесе вирус бар сиякты сезинү;
 - ауырсыну;
 - тамакка немесе асказанга көрсөтү;
 - иштн, кеуденн немесе тамактын ауырсынууну сезинү;
 - шаршау немесе энжар болу;
 - өздөггдген тыншы немесе көңлсз болу немесе мүлде «өзине уксаму»;
 - табеттн жоктыгы немесе табеттн төмөндөү; жөнө
 - катты тагамдарды жөүд каламу/катты тагамдарды жөй алмау.
- Мундай белгилер өзгөшлөнөдн немесе өзгөрөдн, ауырсыну күшөйөдн немесе басылалы.

Шынашақ немесе тиын тәрізді батареяларды жұтқанның ерекше белгісі – жаңа (ашық қызыл түсті) қанмен күсу. Егер балада бұл белгілер байқалса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.

Айқын белгілердің болмауы – осы себепті үйдегі «жалпақ» немесе қосалқы шынашақ немесе тағы тәрізді батареялармен және олар бар өнімдермен қырағылық таныту маңызды.



C10567405
G11165989
19.04.2023



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com